



Cerazette®

Церазетте
75 мг дезоргестрол

Ryska

Для тех, кому выписали Церазетте

Вам получили рецепт перорально-контрацептивных пили Церазетте без эстрогенных компонентов.

Церазетте содержит только гестаген, т.е. гормон похожий на лютеиновый гормон, жёлтое тело, которое образуется в Ваших яичниках. Несмотря на это, Церазетте эффективно предупреждает нежелательную беременность представляя собой контрацептивные пили содержа эстроген и гестаген.

Как действует Церазетте?

Суть удачной контрацепции заключается в том, что Церазетте подавляет овуляцию яичников. Кроме того Церазетте повышает вязкость слизи в канале шейки матки, приостанавливает подвижность и секрецию в маточных трубах, препятствует прохождению сперматозоидов.

Какие побочные явления может причинить Церазетте?

Как и все другие контрацептивные препараты Церазетте может способствовать появлению побочных явлений. Явления эти незначительные и в течении нескольких месяцев обычно исчезают. Такими явлениями могут быть головные боли, тошнота, чувство боли/напряжения в грудной области, а также изменить характер менструального кровотечения. Советуем обратиться к врачу/акушерке, если принимая Церазетте эти явления будут Вас слишком беспокоить.

Как Церазетте воздействует на характер менструального кровотечения?

Принимая Церазетте, картина менструального кровотечения может подвергнуться изменению. У некоторых женщин уменьшаются или полностью могут прекратиться кровотечения, а у других могут стать непредсказуемо обильными и продолжительными. Даже при изменении характера менструального кровотечения, продолжайте принимать Церазетте каждый день. Если кровотечения станут для Вас неприятно тягостными поконтрактируйте с врачом или акушеркой.

Как мне принимать Церазетте?

Каждая карта Церазетты содержит 28 таблеток с одинаковым содержанием. На передней стороне карты, стрелками расположенными между таблетками, указывается очередность принятия таблеток, за которой Вы должны проследить. На обратной стороне карты к каждой таблетке указаны соответствующие дни недели.

- Вы должны начать принимать Церазетте в первый же день менструального цикла. Начните с отмеченной таблетки верхнего ряда соответствующей дню недели.

- Проследите за направлением стрелок и продолжайте принимать таблетки соответственно дне недели до окончания карты. Таким образом Вы сможете проследить за порядком принятия таблеток в соответствующий день. Принимайте таблетки ежедневно и в одно и то же время.
- С окончанием одной карты, не прерывая режим, продолжайте приём лекарства начиная со второй карты. Точно так же начните приём с отмеченной таблетки верхнего ряда, в соответствии со днём недели.
- При переходе от мини-пили к Церазетте, Вы это сможете сделать в любой день недели в непрерывном режиме.
- При переходе от комбинированных контрацептивных пили, Вы начинаете приём Церазетте на следующий день после принятия последней активной таблетки.
- После родов, Вы сможете сразу же приступить к приёму Церазетте, не ожидая начатия послеродового менструального цикла.
- Беременность можно будет исключить, с истечением более 21 дня после родов. В течении первой недели необходимо воспользоваться применением дополнительных методов контрацепции.
- После аборта, сделанного в первые 3 месяца беременности, начните немедленно принимать Церазетте и нет необходимости в дополнительных методах контрацепции.
- Если Вы принимаете другие гормонально-противозачаточного препараты, советуем поконтактировать с гинекологом или акушеркой для дополнительной информации.

Как мне поступить если я забыла принять таблетку?

Если Вы забыли принять таблетку, примите её как только вспомните об этом. Затем, оставшиеся таблетки, продолжайте принимать в том же режиме как указано на карте. Если после последней принятой таблетки Церазетте прошло 36 часов, тогда необходимо применение дополнительных методов контрацепции, например презерватив, в течении ближайшей недели.

Рвоты и диареи

При рвотах и/или диареях и использовании таблеток содержащий уголь могут ухудшить эффект Церазетты. Воспользуйтесь дополнительными методами контрацепции в ближайшую неделю, не прекращая принимать Церазетте.

Другие лекарственные препараты

Противопоказано одновременно принимать Церазетте с некоторыми группами лекарств, например как препараты против эпилепсии или туберкулёза. Предупредите всегда врача назначающего Вам лекарство о тех лекарствах, которые Вы принимаете.

Поконтактируйте с врачом/акушеркой

- Если Вы ощущаете отягчающие побочные явления во время принятия Церазетте.
- Если Вы желаете прекратить принимать Церазетте по причине любого побочного явления.

Будьте внимательны!

Церазетте не является защитой против половых заболеваний, например против герпеса, хламидии, гонореи, кондилома или ВИЧа. Поэтому, воспользуйтесь дополнительными методами контрацепции если у Вас новый партнёр. В этом случае Вы будете защищены как от беременности так и от инфекции.